

本品不良反应发生率与剂量和疗程有关。常见不良反应包括：头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、便秘、失眠、乏力、嗜睡、口干、味觉异常、味觉减退、味觉丧失、味觉倒错、味觉过敏、味觉异常、味觉减退、味觉丧失、味觉倒错、味觉过敏、味觉异常、味觉减退、味觉丧失、味觉倒错、味觉过敏。

本品不良反应发生率与剂量和疗程有关。常见不良反应包括：头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、便秘、失眠、乏力、嗜睡、口干、味觉异常、味觉减退、味觉丧失、味觉倒错、味觉过敏、味觉异常、味觉减退、味觉丧失、味觉倒错、味觉过敏。

本品不良反应发生率与剂量和疗程有关。常见不良反应包括：头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、便秘、失眠、乏力、嗜睡、口干、味觉异常、味觉减退、味觉丧失、味觉倒错、味觉过敏、味觉异常、味觉减退、味觉丧失、味觉倒错、味觉过敏。

一、用法用量

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用。



本品不良反应发生率与剂量和疗程有关。常见不良反应包括：头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、便秘、失眠、乏力、嗜睡、口干、味觉异常、味觉减退、味觉丧失、味觉倒错、味觉过敏、味觉异常、味觉减退、味觉丧失、味觉倒错、味觉过敏。

本品不良反应发生率与剂量和疗程有关。常见不良反应包括：头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、便秘、失眠、乏力、嗜睡、口干、味觉异常、味觉减退、味觉丧失、味觉倒错、味觉过敏、味觉异常、味觉减退、味觉丧失、味觉倒错、味觉过敏。

本品不良反应发生率与剂量和疗程有关。常见不良反应包括：头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、便秘、失眠、乏力、嗜睡、口干、味觉异常、味觉减退、味觉丧失、味觉倒错、味觉过敏、味觉异常、味觉减退、味觉丧失、味觉倒错、味觉过敏。

本品不良反应发生率与剂量和疗程有关。常见不良反应包括：头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、便秘、失眠、乏力、嗜睡、口干、味觉异常、味觉减退、味觉丧失、味觉倒错、味觉过敏、味觉异常、味觉减退、味觉丧失、味觉倒错、味觉过敏。

本品不良反应发生率与剂量和疗程有关。常见不良反应包括：头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、便秘、失眠、乏力、嗜睡、口干、味觉异常、味觉减退、味觉丧失、味觉倒错、味觉过敏、味觉异常、味觉减退、味觉丧失、味觉倒错、味觉过敏。

(现场流病)




图 1. 2014 年病例分布



图 2. 2015 年病例分布